

NÃO SE ESQUEÇA DE USAR CAMISINHA

ESQUECEU DE USAR? A CAMISINHA ROMPEU? Não se desespere!

Vá a UPA e peça a PEP, ela é a profilaxia pós-exposição ao HIV,
é de graça e você pode usar até 72 horas de ter se exposto.

Mas a PEP só funciona para HIV e existem diversas
outras IST's por aí, então não deixe
de usar camisinha por conta dela, ok?

UPA: Rua das Acácias s/nº - Âncora

**Procure o SAE ou a Unidade de Saúde mais próxima
de sua casa e faça o teste rápido HIV.**

Seu atendimento será feito com sigilo e privacidade

**SAE - Serviço de Assistência Especializada em
IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais de Rio das Ostras**

Av. Campomar, s/n - Cidade Beira Mar (22) 2760-2736.

O que é PEP?



O que é PEP?

Profilaxia Pós Exposição ao HIV

A PEP é uma medida de prevenção da infecção ao HIV que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco em situações de exposição ao vírus.

A exposição pode ocorrer nos seguintes casos:

Em contato com materiais biológicos infectantes (sangue, sêmen, fluidos vaginas ou outros) nos casos de exposição percutânea, mucosa ou pele não íntegra.

Testagem rápida:

Nas situações de exposição recomenda-se a testagem com a utilização de testes rápidos, da pessoa exposta e, se possível, da pessoa fonte.

Quando iniciar?

A PEP é considerada uma urgência médica e deve ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo em 72 horas.

Duração da PEP

Os antirretrovirais são utilizados por 28 dias para garantir a eficácia da PEP. A pessoa exposta deve ser acompanhada pela equipe de saúde por 90 dias.

Rede de PEP

A Rede de PEP deve ter como porta de entrada um serviço de atendimento 24 horas, por exemplo Prontos Socorros, UPA ou outros serviços da rede de urgência e emergência. O seguimento dos casos pode ocorrer nos Serviços de Atenção Especializada ou em outros serviços disponíveis localmente.

USUÁRIO

- A PEP é um direito seu.
- A PEP é uma medida eficaz de prevenção ao HIV.
- As situações de exposição ao HIV são urgências. Nestes casos procure o serviço de saúde imediatamente.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

- Ofereça a PEP em todas as situações consideradas de risco ao HIV.
- Utilize o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT PEP) em seus atendimentos.
- PEP é uma urgência médica e o acolhimento é essencial.

GESTOR

- Organize sua rede.
- Garanta a educação permanente dos profissionais de saúde.
- Disponibilize aos usuários as informações sobre os serviços de atendimento de PEP em seu território.

Acesse o site www.aids.gov.br para saber mais sobre o PCDT PEP e onde encontrar o serviço de saúde mais próximo a você.