

COMO PREVENIR?

Já conversou com sua parceria sexual sobre uso de camisinha e realização de testagem?

- Usar preservativo (camisinha) (interno ou externo) é a forma mais importante de prevenção da sífilis!
- Realizar testes rápidos para ISTs pelo menos uma vez ao ano.
- As gestantes e suas parcerias sexuais devem ser testados durante o pré-natal.

Não deixe de compartilhar essas informações com seus amigos e familiares.

#SÍFILIS:
INFORMAÇÃO E SAÚDE

QUER SABER MAIS SOBRE TEMAS VOLTADOS À SEXUALIDADE E ONDE ENCONTRAR PRESERVATIVOS, TESTES PERTO DE VOCÊ E OUTRAS FORMAS DE PREVENÇÃO?

BAIXE E ACESSE O APP SEXUALIDADE SEM CAÔ.



PODE SER BAIXADO PARA ANDROID E IPHONE.



#SÍFILIS:
INFORMAÇÃO E SAÚDE



#INFORMAÇÃO #PREVENÇÃO
#PRESERVATIVO
#TESTERÁPIDO
#SAÚDE
#AUTOCUIDADO

REALIZAÇÃO



EM COOPERAÇÃO



COLABORAÇÃO



Informação é fundamental para uma vida sexual saudável!

Conheça mais sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST) para saber como se prevenir:

SÍFILIS

A sífilis é uma IST causada pela bactéria *Treponema pallidum*.

200



juninho_06

Vamos falar sobre ISTs?
Curtido por 6.123 pessoas
Áudio original

Como transmite??



Através de relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou da mãe para a criança durante a gestação ou parto.



juninho_06

SÍFILIS CONGÊNITA

Transmissão da sífilis da mãe para a criança durante a gestação. Se a sífilis não for tratada ou se não for tratada adequadamente, ela pode levar a complicações, como: abortamento espontâneo, parto prematuro, malformação do feto, surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência mental e/ou morte ao nascer.

1k 653

#sífilis #saúde #autocuidado

SEARCH

Quais os sintomas da Sífilis?

SEARCH

Tipos de ISTs

E OS SINTOMAS?


Os sinais e sintomas da sífilis variam de acordo com cada estágio da doença.

SÍFILIS PRIMÁRIA


Essa ferida desaparece sozinha, com ou sem tratamento, o que não significa que a doença foi curada!

A cura é comprovada através do acompanhamento com exames de sangue

Normalmente, ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na virilha;



SÍFILIS SECUNDÁRIA



Se a ferida inicial não for tratada, após alguns meses podem surgir manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés.

Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo.

As manchas desaparecem em algumas semanas, mesmo sem tratamento, trazendo a falsa impressão de cura.

SÍFILIS LATENTE

Pode haver um período em que a pessoa infectada não apresente nenhum sinal ou sintoma.

SÍFILIS TERCIÁRIA

Pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção.

Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

COMO É O TRATAMENTO?

Através de aplicações de penicilina benzatina (benzetacil), que pode ser feita na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.